

Ficha Informativa

Verdilhão-comum



Verdilhão-comum

© Nelson Menezes – nelsonmenezes.pt

Nome comum: Verdilhão-comum

Nome científico: *Chloris chloris*

Características morfológicas

O verdilhão-comum é uma ave robusta e rechonchuda que normalmente mede entre 14 a 15 centímetros. Os machos têm penas esverdeadas por todo o corpo, à exceção da cauda e das asas que apresentam tons mais amarelos, pretos e cinzentos. A cauda, em tons de amarelo, é bifurcada. O bico é curto, consistente, esbranquiçado e tem a forma de cone. As patas são rosadas. As fêmeas e os juvenis apresentam uma plumagem com cores mais esbatidas, em tons de castanho.

Verdilhão-comum

© Sérgio Moreira - flickriver.com

Habitat

O verdilhão-comum é abundante em todo o território nacional, e encontra-se também na Europa, Ásia Ocidental e África Setentrional. Esta espécie foi introduzida na Austrália, Nova Zelândia e Uruguai. Esta ave convive bem com a presença humana e costuma frequentar parques, jardins, florestas e campos agrícolas em busca de alimento.



Alimentação

O verdilhão-comum é uma ave omnívora, a sua alimentação é à base de frutos, grãos, sementes e insetos. As sementes de girassol são o seu alimento favorito. No período de reprodução tem o hábito de apanhar pequenos invertebrados para dar às suas crias.



Verdilhão-comum

© PedroLMarques – flickriver.com

Reprodução

A época de reprodução do verdilhão ocorre entre abril e agosto. A fêmea constrói o ninho num arbusto ou árvore pequena e nele põe entre 4 e 6 ovos. A incubação dura entre 3 e 14 dias e é feita pela fêmea que é alimentada pelo macho. As crias que permanecem no ninho durante cerca de 20 dias, sendo alimentadas pelos pais, nascem com uma penugem acinzentada e comprida, que mais tarde cai para dar lugar às penas definitivas.

Estatuto de conservação ou abundância em Portugal

O estatuto de conservação desta espécie é pouco preocupante em Portugal, pois o verdilhão-comum encontra-se distribuído de norte a sul do país. Esta espécie pode ser avistada durante todo o ano, embora haja bandos de maior dimensão durante o inverno, sobretudo nas áreas agrícolas.



Verdilhão-comum

© Renzodionigi – flickriver.com

Bibliografia

Aves de Portugal

<http://www.avesdeportugal.info/carchl.html>

Aves dos Açores

<https://avesdosazores.wordpress.com/aves-dos-acoeres/especies-nidificantes-terrestres/verdilhao/>

Blog dos Bichos

<https://blogdosbichos.blogs.sapo.pt/518245.html>

Nelson Menezes

<http://www.nelsonmenezes.pt/fotografias/aves/verdilhao/verdilhao.html>

Wikipédia

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Verdilh%C3%A3o>