

ECO-TRILHOS GAVIONENSE

“UMA EXPERIÊNCIA AOS OLHOS DOS MAIS NOVOS”

ESTAÇÃO 3- Biodiversidade da Fauna



O gavião-caboclo possui o nome científico de *Buteogallus meridionalis*. Pertence a família *Accipitridae* e em inglês é chamado de *Savanna Hawk*. A espécie possui o nome popular de Gavião-fumaça pois tem costume de capturar presas que estão fugindo de incêndios florestais. Este nome popular também é dado ao gavião-de-rabo-branco (*Geranoaetus albicaudatus*) pelo mesmo motivo. Também é conhecido pelos nomes casaca-de-couro, gavião-puva, gavião-telha, gavião-mariano e gavião-tinga. Conheça também o gavião-pernilongo.

O javali (*Sus scrofa*) é um mamífero *artiodactyla* (animais ungulados - com número par de dedos na pata), pertencente à família *suidae*. Esta espécie é originária da Europa e da Ásia, mas foi introduzida em vários lugares do mundo e hoje existe em todos os continentes, só não está presente na Antártida. A subespécie mais comum é a *Sus scrofa scrofa* (Javali-europeu) e *Sus scrofa domesticus* (porco doméstico).

Habitam diversos tipos de ambiente. Se adaptaram ao calor e ao frio, apesar de preferirem temperaturas amenas. Vivem desde savanas, áreas florestais, áreas agrícolas, pântanos, até áreas com temperatura severa e neve. Mas precisam de vegetação para se esconder dos predadores e água por perto.

Melro-preto

Os machos possuem uma coloração preta, bico alaranjado e uma auréola amarelada em torno do olho. As fêmeas e juvenis apresentam uma coloração acastanhada. Todos possuem cerca de 25 cm de comprimento e uma cauda comprida. Alimentam-se de minhocas, insectos, frutos e bagas.

É uma ave residente, podendo ser observado durante todo o ano. É uma das espécies mais adaptadas aos meios urbanos, sendo comum em terrenos arborizados, campos, bosques, parques e jardins das cidades.

Pintassilgo

É uma ave pequena e atraente (cerca de 12 cm), sem nenhuma outra semelhante. Possui o dorso castanho e asas pretas com uma banda amarela larga bem visível tanto pousada como em voo. A cabeça possui um padrão facial branco e preto e faces vermelhas. Os sexos são idênticos. Pode ser observado em durante todo o ano, embora seja mais comum no Sul do que no Norte do país. O seu habitat inclui bosques, campos, pomares e parques e jardins.

Cofinanciado por:

