

Nome da escola: EB 2,3 Padre Abílio Mendes

Concelho: Barreiro

Nome vulgar: Chapim-real

Nome Científico: Parus major


Estatuto de conservação: não ameaçado

É a espécie de chapim com maior área de distribuição, ocorrendo em praticamente toda a Europa. É uma ave comum e com populações estáveis na maioria da sua área de distribuição.

Distribuição Geográfica

Ameaças/Curiosidades : migratório do Norte da Escandinávia.

Parus major **Chapim-real**



CHAPIM-REAL

Aspecto geral	100 chapim
Comprimento	13,5-14,5 cm
Habitat	arvore, bosque, charnecas, castiçais, arbore
Comportamento	essencial, avança voo e pouca na vegetação
Gregarismo	1-30
Voo	arrastado: avião
Vocalização	silva e o mais comum: chup-chup-chup

IDENTIFICAÇÃO

Adulto	preto
Coroa	verde; asas azul-cinza
Parte superior	azul-claro
Uropígio	azul-claro, comprimento médio
Cauda	charneca; penas externas brancas
Garganta	garganta preta
Peito	amarelo; riscas preta central
Abdômen	amarelo; riscas preta central
Bico	preto; curto e alongado
Patas	pretas; comprimento médio
Juvenil	coroa preto-acinzentada

REPRODUÇÃO



Ninho	em forma de lago num buraco de árvore ou, raramente, em cavidade
Ovos	5-12, brancos, com manchas avermelhadas
Incubação	13-14 dias
Criar	professas; parvulas
Primeiro voo	16-22 dias
Posturas	1. Março-Mai
Alimentação	insetos, sementes
População	abundante

de todos os chapins aparece com manchas de verde; as caixas de para aves. As asas são brancas. Parte inferior bem demarcada no as circundadas por mente. ante e bem e parte da
e real é maior e te preto, e linha

O mais facilmente marcado de todos os chapins, com bico e bico preto-brilhante associados a linha preta compacta que circunda as faces brancas. Linha preta vertical ao longo do peito e do dorso. Linha preta vertical ao longo do peito e do dorso. Linha preta vertical ao longo do peito e do dorso. Linha preta vertical ao longo do peito e do dorso. Linha preta vertical ao longo do peito e do dorso.

Associa-se a bandos mistos de chapins fora da época de reprodução. O seu repertório inclui uma grande variedade de chamamentos e de cantos; estes doze são cinquenta e sete formas distintas. Distribuição: Residente comum e bem distribuído por toda a Europa; migratório no Norte da Escandinávia.

Espécies análogas: O chapim-real é muito mais pequeno e possui uma linha ventral mais atenuada e um bico e patas de cabeça mais claros.



J	E
F	6
M	6
A	6
M	6
J	6
J	6
A	6
S	6
O	6
N	6
E	6

