

Orquídeas selvagens/Vegetação

Nesta paragem, podemos encontrar orquídeas selvagens da espécie *Serapias cordigera*, também conhecidas como Serapião-de-flores-grandes. Esta planta ocorre naturalmente em Portugal Continental (planta autóctone) e a sua época de floração é entre maio e junho.

A *Serapias cordigera* pode alcançar 40 cm de altura, e é caracterizada por: pétalas purpúreas de base arredondada, labelo quase negro com pilosidade branca e sépalas lanceoladas. Esta espécie pode ser encontrada em prados, clareiras de bosques e matos, pastagens e hortas.

É importante realçar que esta espécie de orquídea é protegida, logo não devemos apanhar as suas flores pois é necessário assegurar a sua preservação.



Chapinha (xisto- construção)

Nesta zona, podemos observar várias construções tradicionais em xisto e em quartzito (rochas metamórficas). Estas rochas, por serem abundantes na região, foram selecionadas como material de construção.

Enquanto o xisto é fácil de trabalhar graças à sua textura folheada, o quartzito, cuja componente principal é o quartzo (mineral com elevada dureza), é mais resistente e consequentemente mais difícil de utilizar.

Assim em zonas mais fracas dos edifícios construídos em xisto, como a área sobre portas e janelas, eram utilizados materiais mais duros, neste caso o quartzito.

